

Облікова картка НДДКР

Державний обліковий номер: 0216U000346

Державний реєстраційний номер: 0114U003142

Відкрита

Дата реєстрації: 29-01-2016



1. Етапи виконання

Номер етапу: 2

Назва етапу: Провести ретроспективний аналіз віддалених результатів спленектомії у хворих на НГЛ, провести 10-12 СЕ при НГЛ

Початок етапу: 01-2015

Закінчення етапу: 12-2015

Вид звітнього документа: Проміжний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Державна установа "Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02012088

Підпорядкованість: Національна академія медичних наук України

Адреса: 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45

Телефон: (32) 238-32-47

E-mail: ipktm@ukr.net

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Державна установа "Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02012088

Адреса: вул. Генерала Чупринки, 45, м. Львів, Львівська обл., 79044, Україна

Підпорядкованість: Національна академія медичних наук України

Телефон: 0322383247

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

КПКВК: 6561040

Напрямок фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

Джерело фінансування: 7713 - кошти держбюджету

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 530 тис. грн.

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Дослідити безпосередні та віддалені наслідки спленектомії при лімфомах з ураженням селезінки з метою оптимізації лікування хворих

Назва роботи (англ)

To investigate the immediate and remote consequences splenectomy in splenic lymphoma with lesions in order to optimize treatment

Реферат (укр)

Об'єкт дослідження - 41 хворий на дифузну великоклітинну лімфому, 32 пацієнти на негоджкінську лімфому маргінальної зони та 2 пацієнти на гепатоспленічну Т-клітинну лімфому. Мета роботи - з'ясування ефективності спленектомії у хворих на негоджкінські лімфоми і на основі віддалених результатів переглянути та розробити сучасні показання, характер, тактику операційного втручання та ведення післяопераційного періоду у цих хворих. У роботі застосовано клінічні, цитологічні, гістологічні, рентгенологічні, сонографічні, імунофенотипові дослідження, комп'ютерна томографія. Проведено ретроспективний аналіз безпосередньої ефективності спленектомії у 41 хворого на дифузну великоклітинну лімфому, 32 пацієнтів на лімфому маргінальної зони і 2 хворих на гепатоспленічну Т-клітинну лімфому. Спленектомія ліквідовує абдомінальний дискомфорт, усуває явища гіперспленізму, знижує залежність від хіміотерапії, зменшує прояви регіонарної портальної гіпертензії. При дифузних великоклітинних лімфомах безпосередня ефективність спленектомії зафіксована у 87,8 % пацієнтів. У випадках гепатоспленічної Т-клітинної лімфоми операційне лікування виявилось безуспішним. Найбільш ефективною була спленектомія при негоджкінських лімфомах маргінальної зони селезінки. Лише один пацієнт помер в близькому післяопераційному періоді.

Реферат (англ)

The object of study - 43 patients with diffuse large cell lymphoma, 33 non-Hodgkin's lymphoma patients in marginal areas, 2 patients in hepatosplenic T-cell lymphoma, 5 patients in mantle zone lymphoma, 4 follicular lymphoma patients in 7 patients with lymphoma in vorychastyh lymphocytes, 2 patients with diffuse large cell T-cell lymphoma, 13 patients on mature-cell lymphomas of low degree malignancy classification Working Formulation. Purpose - to ascertain the effectiveness of splenectomy in patients with non-Hodgkin's lymphoma and based on long-term results to review and develop current indications, nature, tactics of surgical intervention and postoperative care in these patients. The paper used clinical, cytological, histological, radiological, sonographic, immunophenotype studies, computed tomography. A retrospective analysis of direct and distance results splenectomy in 43 patients to diffuse large cell lymphoma, 33 patients for lymphoma marginal zone, 2 patients hepatosplenic T-cell lymphoma, 5 patients with lymphoma of mantle zone, 4 patients with follicular lymphoma, 7 patients for lymphoma with vorychastyh lymphocytes, 2 patients with diffuse big-cell T-cell lymphoma, 13 patients with mature cell lymphomas of low degree malignancy classification Working Formulation. Splenectomy eliminates abdominal discomfort, eliminates the phenomenon of hypersplenism, reduces dependence of chemotherapy, reduces the manifestations of regional portal hypertension. In diffuse lymphoma velykoklitynnih immediate effectiveness of splenectomy recorded in 91.4% of patients. In cases hepatosplenic T-cell lymphoma and diffuse large T-cell lymphoma operative treatment proved unsuccessful. The most effective splenectomy was in Non-Hodgkin's lymphoma marginal zone of the spleen.

Індекс УДК: 616.15; 615.38, 615.384:615.03

Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.33

6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1

Назва продукції (укр): Спосіб прогнозування ефективності спленектомії у хворих на негоджкінські лімфоми в залежності від типу лімфоми

Назва продукції (англ): Method of predicting the effectiveness of splenectomy in patients with non-Hodgkin lymphoma, depending on the type of lymphoma

Очікувані результати: поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих

Галузь застосування: 85.12 - медична практика

Опис продукції (укр): Спленектомія є одним із методів лікування негоджкінських лімфом (НГЛ). Операція виконується при виражених спленоменгальїях, імунних цитопеніях, неефективності хіміотерапії. Проте, в ряді випадків зафіксовано повну відсутність безпосереднього ефекту від операцій. Проведено ретроспективний аналіз ефективності спленектомії у пацієнтів на дифузну великоклітинну В-клітинну лімфому (DLBCL), дифузну великоклітинну Т-клітинну лімфому (DLTCL), лімфому маргінальної зони селезінки (SMZL), лімфому селезінки з ворсинчастих лімфоцитів (SLVL), фолікулярну лімфому (FL), лімфому мантийної зони (MSL), гепатоспленічну Т-клітинну лімфому (HSTL). При DLTCL та HSTL спленектомія виявилась неефективною. Виживання всіх пацієнтів після операції становило 1-4 місяці. Таким чином, наявність у хворого DLTCL або HSTL є абсолютним протипоказом до проведення спленектомії.

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Стадія завершеності НТП: Ідея, концепція

Впровадження НТП: Впроваджено

Строки впровадження: 01.2014 - 12.2016

Виробник продукції: ДУ "ІПКТМ НАМН"

Споживачі продукції: Установи та заклади хірургічного профілю

Перспективні ринки: Україна

Права інтелектуальної власності: За договорами

Форми та умови передачі продукції: Навчання персоналу

7. Бібліографічний опис

1.Y. Vyhovska, Y. Yevstakhevych, I. Yevstakhevych, O. Vygovska, G. Diakiv, V. Loginsky. Efficacy of Splenectomy in Chronic Lymphocytic Leucemia Associated with Immune Cytopenias // 19th Congress of the European Hematology Association, Milan, Italy - 2014. - P. 588. 2. Євстахевич Ю.Л., Євстахевич І.Й., Виговська О.Я., Рехтман О.Б. Логінський В.Є. Ефективність спленектомії при хронічній лімфоцитарній лейкемії// Міжвідомчий збірник гематологія і переливання крові. 3. В.А.Барілка, В.Л.Матлан, Ю.Л.Євстахевич, І.Й. Євстахевич, В.Є.Логінський Секреції фактора некрозу пухлин (TNF), трансформуючого фактора росту бета 1 (TGF ?1) та природна цитотоксичність у хворих на злоякісні лімфоми з ураженням селезінки //Міжвідомчий збірник гематологія і переливання крові СФУЛТ 2014, 4. Барілка В.А., Матлан В.Л., Євстахевич І.Й., Євстахевич Ю.Л., Логінський В.Є. "Продукція інтерлейкінів (IL-2, IL-6), фактора некрозу пухлин (TNF) і трансформуючого фактора росту бета 1 (TGF ?1) у хворих з негоджкінськими лімфомами селезінки (НГЛс)" 5. 13. Yuriy Yevstakhevych * 1, Yaroslava Vygovska1, Igor Yevstakhevych 1, Olga Vygovska1, Volodymir OUTCOMES OF SPLENECTOMY IN NON-HODGKIN'S LYMPHOMAS COMPLICATED BY IMMUNE CYTOPENIAS, EHA/ 2015 6. 11. Євстахевич І.Й., Виговська Я.І., Євстахевич Ю.Л., Семерак М.М., Книш О.В., Чабан В.Є., Запотоцька Л.М. Спленектомія при негоджкінських лімфомах: Гематологія і переливання крові - 2015. - №38. - С.385-386 7. 9. Виговська Я.І., Пелень Н.В., Масляк З.В., Євстахевич Ю.Л., Виговська О.Я., Логінський В.Є., Віддалені результати лікування хворих на волосистоклітинну лейкемію: Гематологія і переливання крові - 2015. - №38. - С.361-362.

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 72

Мова звіту: Українська

Кількість файлів у звіті: 1

9. Заключні відомості

Перелік осіб-виконавців

Бардах І.Б.

Войціцький Ю.В.

Запотоцька Л.М.

Книш О.В.

Логінський В.Є

Семерак М.М.

Чабан В.Є.

Ярема О.П.

Керівник організації:

Новак Василь Леонідович

Керівники роботи:

Євстахевич Ігор Йосифович, Виговська Ярослава Іллівна

**Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ**



Юрченко Т.А.